



**AME**  
SANTA FÉ DO SUL



Santa Casa  
VOTUPORANGA



## PREPARO DE EXAME

### COLONOSCOPIA – PERÍODO MANHÃ

#### PARA QUE O EXAME SEJA REALIZADO O PACIENTE DEVE:

Seguir rigorosamente os preparos para o dia do exame;  
Trazer todos os exames realizados anteriormente (caso já tenha realizado algum).

#### MEDICAMENTOS:

BISACODIL  
CLORIDATO DE PIRIDOXINA + DIMENDRINATO  
MANITOL

#### Dois (02) dias antes do exame:

**Café da manhã:** manter como de habitual.

**Almoço e jantar:** comer apenas sopa de legumes com batata, cenoura e chuchu, batida no liquidificador e coada, podendo ser acrescentado caldo de carne ou galinha. Não usar **carne, arroz ou macarrão**.

Nos intervalos das refeições poderá comer gelatina e beber suco à vontade. **Não tomar sucos vermelhos. Às 18:00 h:** tomar 02 comprimidos de BISACODIL.

#### Um (01) dia antes do exame:

**Café da manhã:** manter como de habitual. **Almoço:** igual à refeição do dia anterior.

**Às 12:00h e às 20:00 h:** tomar um (01) comprimido de 50 mg de DIMENIDRINATO + CLORIDATO DE PIRIDOXINA (para evitar vômitos).

**Às 18:00 hrs:** tomar 02 comprimidos de BISACODIL.

#### Na véspera do exame, às 20:00 h – iniciar o preparo:

Se for usar o MANITOL em pó, comprar 150mg em farmácia de manipulação, sendo que este deverá ser diluído em 01 litro de água, podendo, a gosto, acrescentar o suco coado de 01 limão. Tomar 01 copo tipo americano a cada 15 minutos.

Se for usar o MANITOL líquido, comprar 03 frascos de 250 ml a 20 % cada (total de 750 ml), em farmácia ou drogaria, podendo – se a gosto, acrescentar o suco coado de 01 limão. Tomar 01 copo tipo americano a cada 15 minutos.

**Durante a ingestão do MANITOL o paciente deve andar bastante. Não tomar água durante a ingestão do MANITOL.**

**Após a ingestão do MANITOL, o paciente deverá tomar pelo menos 2000 ml de água.**

**Não jantar.**



**AME**  
SANTA FÉ DO SUL



Santa Casa  
VOTUPORANGA



**Manter jejum até a hora do exame.**

**OBS:** Com a ingestão do MANITOL o intestino irá “soltar” como diarreia, podendo ocorrer cólicas abdominais. Ao final, as fezes devem sair líquidas e com a cor semelhante à urina clara e sem presença de resíduos.

**ATENÇÃO; NÃO VIR DE CALÇA JEANS POIS DIFICULTA NA VESTIMENTA APÓS EXAME; PROCURAR VIR DE VESTIDO ( MULHER) OU CALÇA/BERMUDA COM ELASTICO .**

### **ATENÇÃO**

**Pacientes que utilizam medicações como:**

**Antiagregantes Plaquetários:** PLAVIX, REAPRO, TICLID, AGRASTAT, ISCOVER ou AASS. (Suspender o medicamento 7 dias antes do procedimento).

**Anticoagulantes:** MAREVAN, MARCOMAR ou COUMADIN. (Suspender o medicamento 4 dias antes do procedimento, após autorização do médico responsável pela prescrição do medicamento).

**Anticoagulantes Injetáveis:** HEPARINA, CLEXANE ou FRAXIPARINA. (Suspender 1 dia antes do procedimento, após autorização do médico responsável pela prescrição do medicamento).

**PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DE ACOMPANHANTE MAIOR DE 18 ANOS.**