

PREPARO DE EXAME

COLONOSCOPIA – PERÍODO TARDE

PARA QUE O EXAME SEJA REALIZADO O PACIENTE DEVE:

Seguir rigorosamente os preparos para o dia do exame;

Trazer todos os exames realizados anteriormente (caso já tenha realizado algum).

MEDICAMENTOS:

BISACODIL

CLORIDATO DE PIRIDOXINA + DIMENDRINATO

MANITOL

Dois (02) dias antes do exame:

Café da manhã: manter como de habitual.

Almoço e jantar: comer apenas sopa de legumes com batata, cenoura e chuchu batida no liquidificador e coada, podendo ser acrescentado caldo de carne ou galinha. **Não usar carne, arroz ou macarrão.**

Nos intervalos das refeições poderá comer gelatina e beber suco à vontade. **Não tomar sucos vermelhos.** **Às 18:00 h:** tomar 02 comprimidos de BISACODIL.

Um (01) dia antes do exame:

Café da manhã: manter como de habitual.

Almoço/Jantar: igual à refeição do dia anterior.

Às 12:00 e às 20:00 h: tomar um (01) comprimido de 50 mg de DIMENIDRINATO + CLORIDATO DE PIRIDOXINA (para evitar vômitos).

Nos intervalos das refeições poderá comer gelatina e beber suco à vontade. **Não tomar sucos vermelhos.** **Às 18:00 h:** tomar 02 comprimidos de BISACODIL. **Jantar:** igual à refeição do dia anterior.

No dia do exame, às 06:00 h – iniciar o preparo:

Se for usar o MANITOL em pó, comprar 150 mg em farmácia de manipulação, sendo que este deverá ser diluído em 01 litro de água, podendo – se, a gosto, acrescentar o suco coado de 01 limão. Tomar 01 copo tipo americano a cada 15 minutos.

Se for usar o MANITOL líquido, comprar 03 frascos de 250 ml a 20 % cada (total de 750 ml), em farmácia ou drogaria, podendo-se, a gosto, acrescentar o suco coado de 01 limão. Tomar 01 copo tipo americano a cada 15 minutos.

Durante a ingestão do MANITOL o paciente deve andar bastante.

Não tomar água durante a ingestão do MANITOL.



**Após a ingestão do MANITOL, o paciente deverá tomar pelo menos 2000 ml de água.
Manter jejum até o horário do exame.**

OBS: com a ingestão do MANITOL o intestino irá “soltar” como diarreia, podendo ocorrer cólicas abdominais. Ao final, as fezes devem sair líquidas e com a cor semelhante à urina clara e sem presença de resíduos.

**ATENÇÃO; NÃO VIR DE CALÇA JEANS POIS DIFICULTA NA VESTIMENTA APÓS EXAME;
PROCURAR VIR DE VESTIDO (MULHER) OU CALÇA/BERMUDA COM ELASTICO .**

ATENÇÃO

Paciente que utilizam medicações como:

Antiagregantes Plaquetários: PLAVIX, REAPRO, TICLID, AGRASTAT, ISCOVER ou AASS. (Suspender o medicamento 7 dias antes do procedimento).

Anticoagulantes: MAREVAN, MARCOMAR ou COUMADIN. (Suspender o medicamento 4 dias antes do procedimento, após autorização do médico responsável pela prescrição do medicamento).

Anticoagulantes Injetáveis: HEPARINA, CLEXANE ou FRAXIPARINA. (Suspender 1 dia antes do procedimento, após autorização do médico responsável pela prescrição do medicamento).

PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DE ACOMPANHANTE MAIOR DE 18 ANOS.