

## COLONOSCOPIA – PERÍODO TARDE

### PARA QUE O EXAME SEJA REALIZADO O PACIENTE DEVE:

Seguir rigorosamente os preparos para o dia do exame;

Trazer todos os exames realizados anteriormente (caso já tenha realizado algum).

### MEDICAMENTO DE USO NO PREPARO

- **BISACODIL** – 4 comprimidos
- **CLORIDATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 4MG (Vonau)** – 2 comprimido
- **SIMETICONA 40mg** - 1 Frasco
- **MANITOL PÓ 200G** – 01 sache (MANIPULADO EM FÁRMACIA)

### Dois (02) dias antes do exame: \_\_\_\_\_

**Café da manhã:** Chá de cor clara adoçado ou não, com biscoito de água e sal

**Almoço e jantar:** comer apenas sopa de legumes com batata, cenoura e chuchu, batida no liquidificador e coada, podendo ser acrescentado caldo de carne ou galinha. Não usar **carne, arroz ou macarrão**.

Nos intervalos das refeições poderá comer gelatina e beber suco à vontade. **Não tomar sucos vermelhos.**

Às **18:00 h:** tomar 02 comprimidos de BISACODIL.

### Um (01) dias antes do exame: \_\_\_\_\_

**Café da manhã:** Chá de cor clara adoçado ou não, com biscoito de água e sal

**Almoço/Janta:** Igual a refeição do dia anterior (sopa de legumes com batata, cenoura e chuchu, batida no liquidificador e coada, podendo ser acrescentado caldo de carne ou galinha. Não usar **carne, arroz ou macarrão**.

Nos intervalos das refeições poderá comer gelatina e beber suco à vontade. **Não tomar sucos vermelhos.**

Às **18:00 h:** tomar 02 comprimidos de BISACODIL.

### No dia do exame: \_\_\_\_\_

Às **06:00h da manhã** tomar 02 comprimidos de CLORIDATO DE ONDANSETRONA DIHIDRATADO 4MG (vonau)

## **ÍNICIO DO MANITOL: 06:00H DA MANHÃ**

**06:00 horas da manhã:** Misturar 200g de MANITOL em Pó + 40 gotas de Simeticona 40mg em 1 litro de água ou suco natural de cor clara (laranja ou limão – coados).

### **MODO DE USO MANITOL:**

- Iniciar as 06:00h da manhã;
- Tomar 01 copo tipo americano a cada 10 minutos;
- Durante a ingestão do manitol o paciente deve **ANDAR** bastante;
- Após 10 minutos da ingestão do último copo do manitol, deverá tomar **2 LITROS DE ÁGUA;**
- Tomar água até 2 horas antes do exame\_\_\_\_\_.
- Não tomar café da manhã
- Manter jejum absoluto de comida até o exame.

**OBS:** Com a ingestão do MANITOL o intestino irá “soltar” como diarreia, podendo ocorrer cólicas abdominais. Ao final, as fezes devem sair líquidas e com a cor semelhante à urina clara e sem presença de resíduos.

**ATENÇÃO; NÃO VIR DE CALÇA JEANS POIS DIFICULTA NA VESTIMENTA APÓS EXAME;  
PROCURAR VIR DE VESTIDO (MULHER) OU CALÇA/BERMUDA COM ELÁSTICO.**

### **ATENÇÃO**

**Pacientes que utilizam medicações como:**

**Antiagregantes Plaquetários:** PLAVIX, REAPRO, TICLID, AGRASTAT, ISCOVER ou AASS. (Suspender o medicamento 7 dias antes do procedimento).

**Anticoagulantes:** MAREVAN, MARCOMAR ou COUMADIN. (Suspender o medicamento 4 dias antes do procedimento, após autorização do médico responsável pela prescrição do medicamento).

**Anticoagulantes Injetáveis:** HEPARINA, CLEXANE ou FRAXIPARINA. (Suspender 1 dia antes do procedimento, após autorização do médico responsável pela prescrição do medicamento).

**PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DE ACOMPANHANTE  
MAIOR DE 18 ANOS.**