

COLONOSCOPIA ESPECIAL – PERÍODO TARDE

PREPARO PARA PACIENTE QUE APRESENTAR QUADRO DE CONSTIPAÇÃO INTESTINAL: Este quadro é para paciente relata que seu intestino não tem um bom funcionamento em período de 2 dias.

MEDICAMENTO DE USO NO PREPARO

- **BISACODIL** – 4 comprimidos
- **CLORIDATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 4MG (Vonau)** – 4 comprimidos
- **SIMETICONA 40mg** - 1 Frasco
- **MANITOL PÓ 400G** – Dividir em 2 frascos com 200g (MANIPULADO EM FÁRMACIA)

ALIMENTOS PROIBIDOS 03 DIAS ANTES DO EXAME:

- Leite e derivados;
- Café;
- Refrigerante;
- Chá e Sucos de cor escura (Exemplo: Chá Preto, Suco de Uva);
- Sementes;
- Verduras (Exemplo: Alface, Acelga, Almeirão, Couve, Rúcula, Repolho);

Dois (02) dias antes do exame: _____

Café da manhã: Chá de cor clara adoçado ou não, biscoito de água e sal

Almoço e jantar: comer apenas sopa de legumes com batata, cenoura e chuchu, batida no liquidificador e coada, podendo ser acrescentado caldo de carne ou galinha. Não usar **carne, arroz ou macarrão**.

Nos intervalos das refeições poderá comer gelatina e beber suco à vontade. **Não tomar sucos vermelhos.**

Às 18:00 h: tomar 02 comprimidos de BISACODIL.

Um (01) dias antes do exame: _____

Café da manhã: Chá de cor clara adoçado ou não, biscoito de água e sal

Almoço/Janta: Igual a refeição do dia anterior (sopa de legumes com batata, cenoura e chuchu, batida no liquidificador e coada, podendo ser acrescentado caldo de carne ou galinha. Não usar **carne, arroz ou macarrão**. (Jantar até às 19:00h)

Nos intervalos das refeições poderá comer gelatina e beber suco à vontade. **Não tomar sucos vermelhos.**

Às 18:00 h: tomar 02 comprimidos de BISACODIL.

Às 19:30: tomar 02 comprimidos de CLORIDATO DE ONDANSETRONA DIHIDRATADO 4MG (vonau).

ÍNICIO DO MANITOL: 20:00H

20:00h Misturar 200g de MANITOL em Pó + 40 gotas de Simeticona 40mg em 1 litro de água ou suco natural de cor clara (laranja ou limão – coados).

MODO DE USO MANITOL:

- Iniciar as 20:00h;
- Tomar 01 copo tipo americano a cada 10 minutos;
- Durante a ingestão do manitol o paciente deve **ANDAR** bastante;
- Após 10 minutos da ingestão do último copo do manitol, deverá tomar **2 LITROS DE ÁGUA;**
- **Não se alimentar após o uso do manitol, apenas tomar água/suco**

No dia do exame: _____

Às **06:00h da manhã** tomar 02 comprimidos de CLORIDATO DE ONDANSETRONA DIHIDRATADO 4MG (vonau)

ÍNICIO DO MANITOL: 06:00H DA MANHÃ

06:00 horas da manhã: Misturar 200g de MANITOL em Pó + 40 gotas de Simeticona 40mg em 1 litro de água ou suco natural de cor clara (laranja ou limão – coados).

MODO DE USO MANITOL:

- Iniciar as 06:00h da manhã;
- Tomar 01 copo tipo americano a cada 10 minutos;
- Durante a ingestão do manitol o paciente deve **ANDAR** bastante;
- Após 10 minutos da ingestão do último copo do manitol, deverá tomar **2 LITROS DE ÁGUA;**
- Tomar água até 2 horas antes do exame _____.
- Não tomar café da manhã
- Manter jejum absoluto de comida até o exame.

OBS: Com a ingestão do MANITOL o intestino irá “soltar” como diarreia, podendo ocorrer cólicas abdominais. Ao final, as fezes devem sair líquidas e com a cor semelhante à urina clara e sem presença de resíduos.

**ATENÇÃO; NÃO VIR DE CALÇA JEANS POIS DIFICULTA NA VESTIMENTA APÓS EXAME;
PROCURAR VIR DE VESTIDO (MULHER) OU CALÇA/BERMUDA COM ELÁSTICO.**

ATENÇÃO

Pacientes que utilizam medicações como:

Antiagregantes Plaquetários: PLAVIX, REAPRO, TICLID, AGRASTAT, ISCOVER ou AASS. (Suspender o medicamento 7 dias antes do procedimento).

Anticoagulantes: MAREVAN, MARCOMAR ou COUMADIN. (Suspender o medicamento 4 dias antes do procedimento, após autorização do médico responsável pela prescrição do medicamento).

Anticoagulantes Injetáveis: HEPARINA, CLEXANE ou FRAXIPARINA. (Suspender 1 dia antes do procedimento, após autorização do médico responsável pela prescrição do medicamento).

PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME É OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DE ACOMPANHANTE MAIOR DE 18 ANOS.